

吸入指導チェックリスト

フルティフォーム®エアゾール+スペーサー（マウスピース）



あなたが使用するお薬は



スペーサー（エアロチャンバープラス）



1日 2 回 / 1回 吸入

朝 : 時 / 食事前 / 食事後 / ()

夕 : 時 / 食事前 / 食事後 / ()

★ご自身の生活の中で忘れずに行える時間を決めましょう

これらの薬剤は急な症状の悪化を速やかに抑えるお薬ではありません。

喘息の症状や発作が無くても、医師の指示に従い毎日の吸入を欠かさないようにしましょう。

ご自身の判断で吸入の中止・変更をしないでください。□

各部名称の説明



保管上の注意

- ボンベ（アルミニウム缶）を外したり、水にぬらしたりしないようにしてください。
- 火気の近くで保存しないでください。
- 落とすとカウンターの数字が変動する場合があります。
本体を落とさないように注意しましょう。
- 使用後は、地方自治体により定められたボンベの廃棄処理方法に従ってください。

各部名称の説明



フローインジケータが上下に動いていれば正しく吸入できています

使用上の注意

- 付着した薬剤を落とすために、週に1回程度、食器用洗剤（中性洗剤）を薄めたぬるま湯への漬け置き洗いをしてください。洗浄は食洗器もご使用いただけます。乾燥機は使用せず、自然乾燥させてください。
(詳細については、商品添付の説明書をご確認ください)
- 使用期間は1年です。1年間使用した後は、新しいものをご購入ください。

吸入時の注意

- 呼気（吐いた息）は逆流せずフローインジケータから外へ出していくので、マウスピースを咥えたまま息を吐いても問題ありません。
- 吸入器のボンベを押した後、薬剤が出ていかない構造になっていますが、できるだけ早く吸入を行ってください

初めて使用する時のみ行うこと

	手順	チェック項目	できたらチェック
取器取り具入法付へ薬けのの	該当なし		


初回のみ吸入器の空噴霧空打ち	1 吸入器のキャップを開け、薬剤を均一に混ぜるためによく振る		吸入器をよく振りましたか? ★キャップは両端をつまんで外します
	2 カウンターの数字を確認する		★開封時はカウンターの色が“黒”です。
	3 ボンベを4回押す(空噴霧)		★吸入口を体から離して噴霧してください。顔や目に向けて噴霧しないように注意してください。
	4 カウンターの数字を確認する		空噴霧後はカウンターの色が“緑”に変わっていますか？

※3日以上使用していない時も行いましょう



毎日の吸入方法

	手順	チェック項目	できたら チェック
吸入前にすべき操作	1 吸入薬が残っているか確認する	 <p>カウンターは0になっていませんか？ ★薬剤が入っていないなくてもガスだけが噴霧されます。残量を確認してから吸入を始めましょう。</p>	
	2 スペーサーに異物が混入していないか、損傷や部品の欠落がないか確認する		<p>★洗浄後は、正しく組み立てられているか、特に注意して確認しましょう</p>
	3 吸入器のキャップを開け、薬剤を均一に混ぜるためによく振る	  <p>★キャップの両端をつまんで外します 吸い器の上下は正しく持っていますか？ ★ボンベ（アルミ缶）が上、吸入口が下になるように持ちましょう。親指で吸入器の底を支え、人差し指と中指をボンベ（アルミ缶）に添えて持ちます</p>	
	4 ボンベが上になるよう、スペーサーに吸入器を装着する		<p>吸入器とスペーサーの上下は合っていますか？ ★吸入器はボンベが上 スペーサーはフローインジケータが上です</p>
	5 マウスピースのキャップを外す		<p>キャップをまっすぐ引き外します</p>
吸入方法の説明	6 口を開け、スペーサーの吸入口を根元まで深く咥える	 <p>口角に隙間がないようにしっかりと咥えていますか？ ★歯を超えて深く咥えることで、舌が吸入口の下に入り、「お薬の通り道」が自然にできます。</p>	
	7 深呼吸をして、フローインジケータが動くことを確認する		<p>フローインジケータが動かないときは、空気が漏れています。 吸入口を口角に隙間がないようしっかりと咥えましょう</p>

	手順	チェック項目	できたら チェック
吸入方法の説明	8 息を吐いてからボンベを1回押し、ゆっくり大きく深呼吸を3回繰り返す	  <p>★勢いよく速く吸いすぎていると笛が鳴ります。肋骨が膨らむくらいに、ゆっくり大きな深呼吸をしましょう。息を吐くときもマウスピースを咥えたままで構いません。フローインジケータが3回パタパタと動くのを確認しましょう</p> <p>吸う時はアゴとスペーサーの後ろを少し下げて喉に向けると、お薬が気管まで届きやすくなります</p> 	
	9 スペーサーから口を外し口を閉じ、苦しくならない程度（なるべく5秒間）息を止める	 <p>★息止めが難しい場合は、マスクタイプも検討しましょう</p>	
	10 ゆっくり息を吐く		
	主治医の指示で1回に2回以上吸入する場合は、 6～10を繰り返す		
<p>あなたは 1日_____回 1回_____吸入</p> <p>★1度に複数回ボンベを押さないでください。 お薬がスペーサー本体に付着して必要な量のお薬が吸えなくなります</p>			

	11 吸入口を拭いて清潔にしてから、キャップを閉める	 	
吸入後に するべき 操作	12 吸入器をスペーサーから外し、吸入器のキャップを閉める	 	<p>★吸入器を引っ張って、スペーサーから取り外します。</p> <p>★携帯用の袋がある薬剤は袋に入れて保管してください。</p>

	手順		チェック項目	できたら チェック
防止 副 作用 対策	13	口の中3回、喉の奥まで3回ずつうがいを行う	 <p>ブクブクラガい3回、ガラガラうがい3回行いましたか？</p> <p>★うがいができない場合は、食事をしたり、水分を十分に飲んで口の中に薬剤が残らないようにしてください。</p>	

※当院では薬剤別によるうがいの要・不要で混乱がないように全ての薬剤でうがいを掲載しています。

カウンターの色が赤くなってきたら、新しい吸入を準備しましょう。

数字が「0」になつたら新しい吸入器に交換しましょう。

※薬剤が入っていなくてもガスだけが噴霧されます。

参考) 一般社団法人 日本喘息学会、Kyorin Medical Bridge、株式会社アムコ

2023年8月 福岡病院薬剤部作成